Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 50 Note: ____

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

Bestimme das Gefragte: Definitionslücken (Nenner = 0), Nullstellen (Zähler = 0, aber nur im Definitionsbereich), waagerechte Asymptote (Grade vergleichen) oder f(0).

1) $f(x) = \frac{3x-3}{2x^2+3x+1}$: waagerechte Asymptote _____

2) $f(x) = \frac{4x+3}{x^2+6}$: Definitionslücken _____

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

Faktorisiere Zähler und Nenner. Kürzt sich ein Faktor (x – a) heraus, ist x = a eine hebbare Lücke, sonst eine Polstelle. Doppelte Nullstelle des Nenners: Polstelle ohne Vorzeichenwechsel.

1) $f(x) = \frac{-3}{x^2-5x-6}$: Polstelle bei $x = 6$ mit oder ohne VZW? _____

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

Zählergrad = Nennergrad + 1: Polynomdivision, der ganzrationale Teil ist die schiefe Asymptote. Gleicher Grad: Quotient der Leitkoeffizienten. Sonst Vorzeichen der höchsten Potenzen betrachten.

1) $f(x) = \frac{x^3+4x^2+2x}{x^2+3}$: schiefe Asymptote _____

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

Berechne die Grenzwerte an der Stelle x0. Erst einsetzen – kommt 0/0 heraus, faktorisieren und kürzen. Bei Polstellen auf die Seite (+ oder –) achten.

1) $\lim_{x\to 4} \frac{x^3-64}{x-4} =$ _____

2) $\lim_{x\to -1} \frac{x^3+1}{x+1} =$ _____

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

Berechne die Grenzwerte. Merke: Die e-Funktion wächst schneller als jede Potenz, der Logarithmus langsamer. Bei 0/0 hilft die Regel von L'Hospital.

1) $\lim_{x \to \infty} -2x^2 e^{-x} =$ _____

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion (lineare Substitution): Integriere die äußere Funktion und teile durch die innere Ableitung, also durch die Zahl vor x. Kontrolle durch Ableiten.

1) $\int \frac{1}{(3x-4)^2}\,dx =$ _____

2) $\int -2e^{2x}\,dx =$ _____

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit Substitution: Setze u = innere Funktion. Steht deren Ableitung (bis auf einen Faktor) als Faktor davor, wird das Integral einfach.

1) $\int x^2(x^3 + 7)^3\,dx =$ _____

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit partieller Integration: ? u · v´ dx = u · v – ? u´ · v dx. Wähle u so, dass es beim Ableiten einfacher wird (x, ln x).

1) $\int 3x^2\, e^x\,dx =$ _____

2) $\int_0^3 3x\, e^x\,dx =$ _____

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

Der Graph von f rotiert im angegebenen Intervall um die x-Achse. Berechne das Volumen V = pi · ? f(x)² dx exakt (mit pi) und gerundet.

1) $f(x) = x$ auf [0; 2] _____

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

Berechne die uneigentlichen Integrale bzw. Volumen: erst mit einer Grenze b rechnen, dann b -> unendlich (bzw. a -> 0) laufen lassen.

1) $f(x) = \frac{3}{x}$ auf [3; ∞) : Volumen _____

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Gegeben ist f(x) = (x + 3) · e^(–x). Es gilt f´(x) = (–x – 2) · e^(–x) und f´´(x) = (x + 1) · e^(–x). Eine Stammfunktion ist F(x) = –(x + 4) · e^(–x). Tipp: e^(–x) ist nie 0 – eine Gleichung wie (…) · e^(–x) = 0 löst Du, indem Du nur die Klammer gleich 0 setzt.

1) Nullstelle von f (1 P.) _____

2) Hochpunkt (y-Wert auf 2 Stellen runden) (3 P.) _____

3) Wendepunkt (y-Wert auf 2 Stellen runden) (3 P.) _____

4) Fläche zwischen G und der x-Achse für $-3 \leq x \leq 0$ (2 Stellen) (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

1) $y = 0$

2) keine Definitionslücken

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

1) mit VZW: $x = 6$ ist einfache Nullstelle des Nenners

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

1) $f(x) = x + 4 + \frac{-x-12}{x^2+3} \Rightarrow y = x + 4$

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

1) $\lim_{x\to 4} \frac{x^3-64}{x-4} = 48$

2) $\lim_{x\to -1} \frac{x^3+1}{x+1} = 3$

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

1) $\lim_{x\to\infty} -2x^2e^{-x} = 0$

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

1) $\int \frac{1}{(3x-4)^2}\,dx = -\frac{1}{3(3x-4)} + C$

2) $\int -2e^{2x}\,dx = -e^{2x} + C$

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

1) $\int x^2(x^3+7)^3\,dx = \frac{1}{12}(x^3+7)^4 + C$

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

1) $\int 3x^2\,e^x\,dx = (3x^2 - 6x + 6)\,e^x + C$

2) $\int_0^3 3x\,e^x\,dx = 3(2e^3+1) \approx 123{,}51$

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

1) $V = \pi\int_0^2 (x^2)dx = \frac{8}{3}\pi \approx 8{,}38$

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

1) $V = \pi\int_3^{\infty} \frac{9}{x^2}\,dx = 3\pi \approx 9{,}42$

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $(x+3)\cdot e^{-x} = 0 \;\Rightarrow\; x = -3$

2) $f'(x) = 0 \;\Rightarrow\; x = -2, \quad f(-2) = e^2 \approx 7{,}39 \;\Rightarrow\; H(-2 \mid 7{,}39)$

3) $f''(x) = 0 \;\Rightarrow\; x = -1, \quad f(-1) = 2e^1 \approx 5{,}44 \;\Rightarrow\; W(-1 \mid 5{,}44)$

4) $A = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx = F(0) - F(-3) = -4 + e^3 \approx 16{,}09$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 48	ab 45	ab 43	ab 40	ab 38	ab 35	ab 33	ab 30	ab 28	ab 25	ab 23	ab 20	ab 17	ab 14	ab 10	ab 0