Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 50 Note: ____

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

Bestimme das Gefragte: Definitionslücken (Nenner = 0), Nullstellen (Zähler = 0, aber nur im Definitionsbereich), waagerechte Asymptote (Grade vergleichen) oder f(0).

1) $f(x) = \frac{-3x+8}{2x^2+2x+2}$: waagerechte Asymptote _____

2) $f(x) = \frac{-3x^2+4x-6}{-x-8}$: Schnittpunkt mit der y-Achse (f(0)) _____

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

Faktorisiere Zähler und Nenner. Kürzt sich ein Faktor (x – a) heraus, ist x = a eine hebbare Lücke, sonst eine Polstelle. Doppelte Nullstelle des Nenners: Polstelle ohne Vorzeichenwechsel.

1) $f(x) = \frac{4}{x^2-4x+4}$: Polstelle bei $x = 2$ mit oder ohne VZW? _____

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

Zählergrad = Nennergrad + 1: Polynomdivision, der ganzrationale Teil ist die schiefe Asymptote. Gleicher Grad: Quotient der Leitkoeffizienten. Sonst Vorzeichen der höchsten Potenzen betrachten.

1) $f(x) = \frac{x^3-3x^2+x-9}{x^2+3}$: schiefe Asymptote _____

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

Berechne die Grenzwerte an der Stelle x0. Erst einsetzen – kommt 0/0 heraus, faktorisieren und kürzen. Bei Polstellen auf die Seite (+ oder –) achten.

1) $\lim_{x \to -5^+} \frac{8}{x^2+10x+25} =$ _____

2) $\lim_{h \to 0} \frac{(h+6)^2-36}{h} =$ _____

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

Berechne die Grenzwerte. Merke: Die e-Funktion wächst schneller als jede Potenz, der Logarithmus langsamer. Bei 0/0 hilft die Regel von L'Hospital.

1) $\lim_{x\to\infty} \frac{2\ln(x)}{x^4} =$ _____

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion (lineare Substitution): Integriere die äußere Funktion und teile durch die innere Ableitung, also durch die Zahl vor x. Kontrolle durch Ableiten.

1) $\int -2e^{4x+7}\,dx =$ _____

2) $\int \frac{4}{(2x+1)^2}\,dx =$ _____

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit Substitution: Setze u = innere Funktion. Steht deren Ableitung (bis auf einen Faktor) als Faktor davor, wird das Integral einfach.

1) $\int \frac{2e^x}{e^x+5}\,dx =$ _____

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit partieller Integration: ? u · v´ dx = u · v – ? u´ · v dx. Wähle u so, dass es beim Ableiten einfacher wird (x, ln x).

1) $\int x^2\,e^{-x}\,dx =$ _____

2) $\int 4\ln(x)\,dx =$ _____

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

Der Graph von f rotiert im angegebenen Intervall um die x-Achse. Berechne das Volumen V = pi · ? f(x)² dx exakt (mit pi) und gerundet.

1) $f(x) = x + 4$ auf $[2;\ 3]$ _____

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

Berechne die uneigentlichen Integrale bzw. Volumen: erst mit einer Grenze b rechnen, dann b -> unendlich (bzw. a -> 0) laufen lassen.

1) $\int_0^{\infty} 3e^{-5x}\,dx$ _____

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

In ein leeres Becken läuft Wasser. Die Zuflussrate in Litern pro Minute beträgt r(t) = t · (12 – t) für 0 <= t <= 12 (t in Minuten). Danach wird der Zufluss geschlossen. Tipp: Die Zuflussrate sagt, wie schnell Wasser kommt. Wie viel Wasser insgesamt gekommen ist, liefert das Integral.

1) Wie groß ist die Zuflussrate nach 3 Minuten? (2 P.) _____

2) Zu welchem Zeitpunkt fließt am meisten Wasser zu? (3 P.) _____

3) Wie groß ist die größte Zuflussrate? (2 P.) _____

4) Wie viele Liter sind nach 12 Minuten im Becken? (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

1) $y = 0$

2) $f(0) = \frac{3}{4}$

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

1) ohne VZW: $x = 2$ ist doppelte Nullstelle des Nenners

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

1) $f(x) = x - 3 + \frac{-2x}{x^2+3} \Rightarrow y = x - 3$

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

1) $\lim_{x \to -5^+} \frac{8}{x^2+10x+25} = +\infty$

2) $\lim_{h \to 0} \frac{(h+6)^2-36}{h} = 12$

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

1) $\lim_{x \to \infty} \frac{2\ln(x)}{x^4} = 0$

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

1) $\int -2e^{4x+7}\,dx = -\frac{1}{2}e^{4x+7} + C$

2) $\int \frac{4}{(2x+1)^2}\,dx = -\frac{2}{(2x+1)} + C$

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

1) $\int \frac{2e^x}{e^x+5}\,dx = 2\ln(e^x + 5) + C$

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

1) $\int x^2\,e^{-x}\,dx = (-x^2 - 2x - 2)\,e^{-x} + C$

2) $\int 4\ln(x)\,dx = 4(x\ln(x) - x) + C$

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

1) $V = \pi\int_2^3 (x^2 + 8x + 16)dx = \frac{127}{3}\pi \approx 132{,}99$

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

1) $\lim_{b\to\infty}\left[-\frac{3}{5}e^{-5x}\right]_0^b = \frac{3}{5}$

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $r(3) = 27\,\frac{\text{l}}{\text{min}}$

2) $r'(t) = (12 - 2t) = 0 \;\Rightarrow\; t = 6\,\text{min}$

3) $r(6) = 36\,\frac{\text{l}}{\text{min}}$

4) $\int_0^{12} r(t)\,dt = \left[12\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3}\right]_0^{12} = 288\,\text{l}$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 48	ab 45	ab 43	ab 40	ab 38	ab 35	ab 33	ab 30	ab 28	ab 25	ab 23	ab 20	ab 17	ab 14	ab 10	ab 0