Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 50 Note: ____

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

Bestimme das Gefragte: Definitionslücken (Nenner = 0), Nullstellen (Zähler = 0, aber nur im Definitionsbereich), waagerechte Asymptote (Grade vergleichen) oder f(0).

1) $f(x) = \frac{5x+6}{x^2-3x-1}$: waagerechte Asymptote _____

2) $f(x) = \frac{4x^2+5x-5}{x+7}$: Schnittpunkt mit der y-Achse (f(0)) _____

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

Faktorisiere Zähler und Nenner. Kürzt sich ein Faktor (x – a) heraus, ist x = a eine hebbare Lücke, sonst eine Polstelle. Doppelte Nullstelle des Nenners: Polstelle ohne Vorzeichenwechsel.

1) $\lim_{x \to 6^+} \frac{-1}{x^2-12x+36}$ _____

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

Zählergrad = Nennergrad + 1: Polynomdivision, der ganzrationale Teil ist die schiefe Asymptote. Gleicher Grad: Quotient der Leitkoeffizienten. Sonst Vorzeichen der höchsten Potenzen betrachten.

1) $f(x) = \frac{-x^2-6x+2}{x-4}$: schiefe Asymptote _____

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

Berechne die Grenzwerte an der Stelle x0. Erst einsetzen – kommt 0/0 heraus, faktorisieren und kürzen. Bei Polstellen auf die Seite (+ oder –) achten.

1) $\lim_{x \to 4^+} \frac{1}{x-4} =$ _____

2) $\lim_{x \to -1} (-2x^2 - 4x + 6) =$ _____

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

Berechne die Grenzwerte. Merke: Die e-Funktion wächst schneller als jede Potenz, der Logarithmus langsamer. Bei 0/0 hilft die Regel von L'Hospital.

1) $\lim_{x \to 0} \frac{e^{-4x} - e^{2x}}{x} =$ _____

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion (lineare Substitution): Integriere die äußere Funktion und teile durch die innere Ableitung, also durch die Zahl vor x. Kontrolle durch Ableiten.

1) $\int -2e^{-2x-6}\,dx =$ _____

2) $\int \frac{6}{3x-5}\,dx =$ _____

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit Substitution: Setze u = innere Funktion. Steht deren Ableitung (bis auf einen Faktor) als Faktor davor, wird das Integral einfach.

1) $\int \sin(x)\cos^6(x)\,dx =$ _____

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit partieller Integration: ? u · v´ dx = u · v – ? u´ · v dx. Wähle u so, dass es beim Ableiten einfacher wird (x, ln x).

1) $\int x^5 \ln(x)\,dx =$ _____

2) $\int (2x + 1)\,e^x\,dx =$ _____

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

Der Graph von f rotiert im angegebenen Intervall um die x-Achse. Berechne das Volumen V = pi · ? f(x)² dx exakt (mit pi) und gerundet.

1) $f(x) = -2x$ auf $[0; 1]$ _____

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

Berechne die uneigentlichen Integrale bzw. Volumen: erst mit einer Grenze b rechnen, dann b -> unendlich (bzw. a -> 0) laufen lassen.

1) $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $[2; \infty)$: Volumen _____

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Gegeben ist f(x) = (x + 3) · e^(–x). Es gilt f´(x) = (–x – 2) · e^(–x) und f´´(x) = (x + 1) · e^(–x). Eine Stammfunktion ist F(x) = –(x + 4) · e^(–x). Tipp: e^(–x) ist nie 0 – eine Gleichung wie (…) · e^(–x) = 0 löst Du, indem Du nur die Klammer gleich 0 setzt.

1) Nullstelle von f (1 P.) _____

2) Hochpunkt (y-Wert auf 2 Stellen runden) (3 P.) _____

3) Wendepunkt (y-Wert auf 2 Stellen runden) (3 P.) _____

4) Fläche zwischen G und der x-Achse für $-3 \le x \le 0$ (2 Stellen) (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

1) $y = 0$

2) $f(0) = -\frac{5}{7}$

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

1) $-\infty$

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

1) $f(x) = -x - 10 - \frac{38}{x-4} \Rightarrow y = -x - 10$

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

1) $\lim_{x \to 4^+} \frac{1}{x-4} = +\infty$

2) $\lim_{x \to -1} \left(-2x^2 - 4x + 6\right) = 8$

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

1) $\lim_{x \to 0} \frac{e^{-4x} - e^{2x}}{x} = -6$

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

1) $\int -2e^{-2x-6}\,dx = e^{-2x-6} + C$

2) $\int \frac{6}{3x-5}\,dx = 2\ln|3x - 5| + C$

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

1) $\int \sin(x)\cos^6(x)\,dx = -\frac{1}{7}\cos^7(x) + C$

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

1) $\int x^5 \ln(x)\,dx = \frac{1}{6}x^6\ln(x) - \frac{1}{36}x^6 + C$

2) $\int (2x + 1)\,e^x\,dx = (2x - 1)\,e^x + C$

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

1) $V = \pi\int_0^1 \left(4x^2\right)dx = \frac{4}{3}\pi \approx 4{,}19$

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

1) $V = \pi\int_2^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\pi \approx 1{,}57$

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $(x+3)\cdot e^{-x} = 0 \;\Rightarrow\; x = -3$

2) $f'(x) = 0 \;\Rightarrow\; x = -2, \quad f(-2) = e^2 \approx 7{,}39 \;\Rightarrow\; H(-2 \mid 7{,}39)$

3) $f''(x) = 0 \;\Rightarrow\; x = -1, \quad f(-1) = 2e^1 \approx 5{,}44 \;\Rightarrow\; W(-1 \mid 5{,}44)$

4) $A = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx = F(0) - F(-3) = -4 + e^3 \approx 16{,}09$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 48	ab 45	ab 43	ab 40	ab 38	ab 35	ab 33	ab 30	ab 28	ab 25	ab 23	ab 20	ab 17	ab 14	ab 10	ab 0