Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 50 Note: ____

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

Bestimme das Gefragte: Definitionslücken (Nenner = 0), Nullstellen (Zähler = 0, aber nur im Definitionsbereich), waagerechte Asymptote (Grade vergleichen) oder f(0).

1) $f(x) = \frac{-4x^2 - x - 3}{x - 5}$: Schnittpunkt mit der y-Achse (f(0)) _____

2) $f(x) = \frac{-8}{x^2 + 5x}$: Definitionslücken _____

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

Faktorisiere Zähler und Nenner. Kürzt sich ein Faktor (x – a) heraus, ist x = a eine hebbare Lücke, sonst eine Polstelle. Doppelte Nullstelle des Nenners: Polstelle ohne Vorzeichenwechsel.

1) $\lim_{x \to 1^+} \frac{-3}{x - 1}$ _____

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

Zählergrad = Nennergrad + 1: Polynomdivision, der ganzrationale Teil ist die schiefe Asymptote. Gleicher Grad: Quotient der Leitkoeffizienten. Sonst Vorzeichen der höchsten Potenzen betrachten.

1) $f(x) = \frac{x^2 - x + 6}{x + 1}$: schiefe Asymptote _____

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

Berechne die Grenzwerte an der Stelle x0. Erst einsetzen – kommt 0/0 heraus, faktorisieren und kürzen. Bei Polstellen auf die Seite (+ oder –) achten.

1) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} =$ _____

2) $\lim_{x \to -3} (-3x^2 + 4x + 3) =$ _____

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

Berechne die Grenzwerte. Merke: Die e-Funktion wächst schneller als jede Potenz, der Logarithmus langsamer. Bei 0/0 hilft die Regel von L'Hospital.

1) $\lim_{x \to -\infty} (5 - 5e^{3x}) =$ _____

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion (lineare Substitution): Integriere die äußere Funktion und teile durch die innere Ableitung, also durch die Zahl vor x. Kontrolle durch Ableiten.

1) $\int 6\sin(x - 2)\,dx =$ _____

2) $\int \frac{3}{-2x-4}\,dx =$ _____

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit Substitution: Setze u = innere Funktion. Steht deren Ableitung (bis auf einen Faktor) als Faktor davor, wird das Integral einfach.

1) $\int \frac{2x+1}{x^2+x-4}\,dx =$ _____

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

Bestimme eine Stammfunktion mit partieller Integration: ? u · v´ dx = u · v – ? u´ · v dx. Wähle u so, dass es beim Ableiten einfacher wird (x, ln x).

1) $\int x\,e^{-3x}\,dx =$ _____

2) $\int (5x)\,e^{x}\,dx =$ _____

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

Der Graph von f rotiert im angegebenen Intervall um die x-Achse. Berechne das Volumen V = pi · ? f(x)² dx exakt (mit pi) und gerundet.

1) $f(x) = x$ auf [0; 4] _____

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

Berechne die uneigentlichen Integrale bzw. Volumen: erst mit einer Grenze b rechnen, dann b -> unendlich (bzw. a -> 0) laufen lassen.

1) $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx$: konvergent oder divergent? _____

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Ein Patient nimmt eine Tablette. Die Konzentration des Wirkstoffs im Blut (in mg pro Liter) beschreibt f(t) = 6 · t · e^(–0,5t), t in Stunden nach der Einnahme. Die Ableitung ist f´(t) = 6 · e^(–0,5t) · (1 – 0,5t). Tipp: Wo die Konzentration am stärksten abnimmt, hat der Graph seinen Wendepunkt (f´´(t) = 0).

1) Konzentration nach 1 Stunde (auf 2 Stellen runden) (2 P.) _____

2) Nach wie vielen Stunden ist die Konzentration am größten? (3 P.) _____

3) Wie groß ist die höchste Konzentration? (auf 2 Stellen runden) (2 P.) _____

4) Wann nimmt die Konzentration am stärksten ab? (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Gebrochenrationale Funktionen und Integrationsmethoden

Aufgabe 1: Definitionslücken und Nullstellen (je 3 P.)

1) $f(0) = \frac{3}{5}$

2) $x_1 = -5,\ x_2 = 0$

Aufgabe 2: Polstelle oder hebbare Lücke (3 P.)

1) $-\infty$

Aufgabe 3: Asymptoten (3 P.)

1) $f(x) = x - 2 + \frac{8}{x+1} \Rightarrow y = x - 2$

Aufgabe 4: Grenzwerte (je 2 P.)

1) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$

2) $\lim_{x \to -3} (-3x^2 + 4x + 3) = -36$

Aufgabe 5: Grenzwerte mit e und ln (2 P.)

1) $\lim_{x \to -\infty} (5 - 5e^{3x}) = 5$

Aufgabe 6: Lineare Substitution (je 2 P.)

1) $\int 6\sin(x-2)\,dx = -6\cos(x-2) + C$

2) $\int \frac{3}{-2x-4}\,dx = -\frac{3}{2}\ln|-2x-4| + C$

Aufgabe 7: Substitution (3 P.)

1) $\int \frac{2x+1}{x^2+x-4}\,dx = \ln|x^2 + x - 4| + C$

Aufgabe 8: Partielle Integration (je 4 P.)

1) $\int x\,e^{-3x}\,dx = -\frac{1}{3}xe^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + C$

2) $\int (5x)\,e^x\,dx = (5x-5)\,e^x + C$

Aufgabe 9: Rotationskörper (4 P.)

1) $V = \pi\int_0^4 (x^2)dx = \frac{64}{3}\pi \approx 67{,}02$

Aufgabe 10: Uneigentliches Integral (3 P.)

1) divergent : $\frac{1}{a} - 1 \to \infty$

Aufgabe 11: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $f(1) = 6 \cdot e^{-0,5} \approx 3,64 \frac{\text{mg}}{\text{l}}$

2) $f'(t) = 0 \Rightarrow 1 - 0,5t = 0 \Rightarrow t = 2\,\text{h}$

3) $f(2) = 12 \cdot e^{-1} \approx 4,41 \frac{\text{mg}}{\text{l}}$

4) $f'(t) = 6 \cdot e^{-0,5t} \cdot (0,25t - 1) = 0 \Rightarrow t = 4\,\text{h}$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 48	ab 45	ab 43	ab 40	ab 38	ab 35	ab 33	ab 30	ab 28	ab 25	ab 23	ab 20	ab 17	ab 14	ab 10	ab 0