

Abitur: Anwendungsaufgaben

Name: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Punkte: _____ von 30

Note: _____

Aufgabe 1: Analysis (10 P.)

Gegeben ist die Funktionenschar $f_a(x) = x^3 - 3a \cdot x^2 - 1$ mit $a > 0$. Tipp: Der Parameter a ist eine feste Zahl, die Du nur nicht kennst – leite ab wie gewohnt. Für die Ortskurve stellst Du $x_T = \dots$ nach a um und setzt in y_T ein.

1) x-Koordinate des Tiefpunkts (Term mit a) (2 P.) _____

2) y-Koordinate des Tiefpunkts (Term mit a) (2 P.) _____

3) Gleichung der Ortskurve aller Tiefpunkte (3 P.) _____

4) Für welches a liegt der Tiefpunkt auf der Höhe $y = -109$? (3 P.) _____

Aufgabe 2: Stochastik (10 P.)

Eine Krankheit haben 2 % der Menschen. Ein Schnelltest zeigt bei Kranken mit 98 % Wahrscheinlichkeit „positiv“. Bei Gesunden zeigt er mit 90 % Wahrscheinlichkeit richtig „negativ“. Eine zufällig ausgewählte Person wird getestet. Tipp: Zeichne ein Baumdiagramm (erst krank/gesund, dann positiv/negativ) und rechne mit Dezimalzahlen.

1) Berechne $P(\text{positiv})$ (auf 4 Stellen runden). (3 P.) _____

2) Der Test ist positiv. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Person krank? (3 Stellen) (4 P.) _____

- 3) Der Test ist negativ. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Person gesund? (4 Stellen) (3 P.) _____

Aufgabe 3: Geometrie (10 P.)

Ein dreieckiges Sonnensegel ist an den Punkten $A(8|0|0)$, $B(0|12|0)$ und $C(0|0|4)$ befestigt (Angaben in Metern). Der Boden ist die x - y -Ebene, der Ursprung O ist die Hausecke. Tipp: Den Normalenvektor des Segels bekommst Du mit dem Kreuzprodukt $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$. Der Winkel zum Boden ist der Winkel zwischen diesem Normalenvektor und der z -Achse.

- 1) Wie groß ist die Fläche des Segels? (in m^2 , 2 Stellen) (3 P.) _____
- 2) Unter welchem Winkel ist das Segel gegen den Boden geneigt? (2 Stellen) (3 P.) _____
- 3) Ein senkrechter Mast steht in $P(2|3|0)$. In welchem Punkt trifft er das Segel? (2 P.) _____
- 4) Wie weit ist die Hausecke O vom Segel entfernt? (2 Stellen) (2 P.) _____

Lösungen: Abitur: Anwendungsaufgaben

Aufgabe 1: Analysis (10 P.)

$$1) \quad f_a'(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a) = 0, \quad f_a''(2a) = 6a > 0 \Rightarrow x_T = 2a$$

$$2) \quad f_a(2a) = 8a^3 - 12a^3 - 1 = -4a^3 - 1$$

$$3) \quad x = 2a \Rightarrow a = \frac{x}{2} \Rightarrow y = -4\left(\frac{x}{2}\right)^3 - 1 = -\frac{1}{2}x^3 - 1$$

$$4) \quad -4a^3 - 1 = -109 \Rightarrow a^3 = 27 \Rightarrow a = 3$$

Aufgabe 2: Stochastik (10 P.)

$$1) \quad 0,02 \cdot 0,98 + 0,98 \cdot 0,1 \approx 0,1176$$

$$2) \quad P_{\text{pos}}(\text{krank}) = \frac{0,02 \cdot 0,98}{0,1176} \approx 0,167$$

$$3) \quad P_{\text{neg}}(\text{gesund}) = \frac{0,98 \cdot 0,9}{0,8824} \approx 0,9995$$

Aufgabe 3: Geometrie (10 P.)

$$1) \quad \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 48 \\ 32 \\ 96 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{1}{2} \sqrt{12544} \approx 56 \text{ m}^2$$

$$2) \quad \cos \alpha = \frac{96}{\sqrt{12544}} \Rightarrow \alpha \approx 31^\circ$$

$$3) \quad \frac{x}{8} + \frac{y}{12} + \frac{z}{4} = 1 \text{ mit } x = 2, y = 3 \Rightarrow S(2 \mid 3 \mid 2)$$

$$4) \quad d = \frac{|48 \cdot 0 + 32 \cdot 0 + 96 \cdot 0 - 384|}{\sqrt{12544}} \approx 3,43 \text{ m}$$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 29	ab 27	ab 26	ab 24	ab 23	ab 21	ab 20	ab 18	ab 17	ab 15	ab 14	ab 12	ab 10	ab 9	ab 6	ab 0