Probe-Klassenarbeit Daten, Boxplot und Wahrscheinlichkeit

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 45 Minuten Punkte: _____ von 24 Note: ____

Aufgabe 1: Mittelwert und Median (je 2 P.)

Berechne die gesuchten Kennwerte. Denke daran: Für den Median musst Du die Werte zuerst der Größe nach ordnen.

1) Median und Modus von 10; 2; 10; 1; 12; 2; 4; 1; 3; 1

2) Median und Modus von 8; 2; 4; 9; 9; 10; 11; 7; 2

Aufgabe 2: Quartile (je 3 P.)

Die Daten sind schon der Größe nach geordnet. Bestimme das untere Quartil Q1, den Median und das obere Quartil Q3 (Eingabe mit Semikolon: Q1; Median; Q3).

1) Daten: 1; 4; 6; 8; 9; 11; 28; 29 _____

2) Daten: 3; 4; 4; 5; 6; 6; 10; 12; 13; 15 _____

Aufgabe 3: Fünf Kennwerte (3 P.)

Ordne die Daten und bestimme die fünf Kennwerte für den Boxplot: Minimum; Q1; Median; Q3; Maximum.

1) Daten: 18; 1; 2; 7; 10; 12; 18; 19; 17; 19 _____

Aufgabe 4: Boxplot auswerten (je 2 P.)

Die fünf Zahlen beschreiben einen Boxplot: Minimum | Q1 | Median | Q3 | Maximum. Beantworte die Frage.

1) 6 | 15 | 20 | 30 | 39 : Spannweite = _____

2) 8 | 15 | 18 | 27 | 35 : Anteil zwischen 27 und 35 (in Prozent) _____

Aufgabe 5: Wahrscheinlichkeit (je 2 P.)

Berechne die Wahrscheinlichkeit als vollständig gekürzten Bruch: P = Anzahl der günstigen Ergebnisse : Anzahl aller Ergebnisse.

1) In einer Urne liegen 3 rote Kugeln, 1 blaue Kugel und 3 grüne Kugeln. Eine Kugel ziehen: *P*(rot oder grün) = ☐

2) In einer Urne liegen 3 rote Kugeln, 1 blaue Kugel und 5 grüne Kugeln. Eine Kugel ziehen: *P*(rot oder grün) = ☐

Aufgabe 6: Zweistufige Versuche (3 P.)

Berechne die Wahrscheinlichkeit als vollständig gekürzten Bruch: P = Anzahl der günstigen Ergebnisse : Anzahl aller Ergebnisse.

1) 2 rote, 6 blaue Kugeln, 2-mal ziehen mit Zurücklegen: *P*(beide rot) = ☐

Lösungen: Probe-Klassenarbeit Daten, Boxplot und Wahrscheinlichkeit

Aufgabe 1: Mittelwert und Median (je 2 P.)

1) geordnet: 1; 1; 1; 2; 2; 3; 4; 10; 10; 12; Median = 2,5; Modus: 1

2) geordnet: 2; 2; 4; 7; 8; 9; 9; 10; 11; Median = 8; Modus: 2; 9

Aufgabe 2: Quartile (je 3 P.)

1) $Q_1 = 5$; Median = 8,5; $Q_3 = 19{,}5$

2) $Q_1 = 4$; Median = 6; $Q_3 = 12$

Aufgabe 3: Fünf Kennwerte (3 P.)

1) 1 | 7 | 14,5 | 18 | 19 (Min | Q_1 | Med | Q_3 | Max)

Aufgabe 4: Boxplot auswerten (je 2 P.)

1) 6 | 15 | 20 | 30 | 39 : Spannweite = 39 – 6 = 33

2) etwa 25 %

Aufgabe 5: Wahrscheinlichkeit (je 2 P.)

1) $P = \frac{6}{7}$

2) $P = \frac{8}{9}$

Aufgabe 6: Zweistufige Versuche (3 P.)

1) $P = \frac{2}{8} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{16}$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6
ab 23	ab 20	ab 17	ab 12	ab 8	ab 0