Probe-Klausur Stochastik

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

Überlege jeweils: Ist die Reihenfolge wichtig? Darf etwas mehrfach vorkommen (Zurücklegen)? Gib die Formel und das Ergebnis an.

1) Wie viele Möglichkeiten gibt es für einen Code aus 4 Buchstaben (A bis Z)?

2) Auf wie viele Arten kann man 4 Läufer auf die Bahnen verteilen?

3) Auf wie viele Arten kann man 6 Buchstaben-Karten in eine Reihe legen?

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

Lege eine Vierfeldertafel oder ein Baumdiagramm an und berechne die gesuchten Wahrscheinlichkeiten. P_A(B) bedeutet: Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A.

1) $P(A) = 0{,}3,\ P_A(B) = 0{,}8,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}5:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

2) $P(A) = 0{,}4,\ P_A(B) = 0{,}8,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}6:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

3) $P(A) = 0{,}5,\ P_A(B) = 0{,}7,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}3:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

Standardisiere mit z = (x – Erwartungswert) : Standardabweichung und lies den Wert der Verteilungsfunktion ab (Tabelle oder Taschenrechner). Runde auf 4 Nachkommastellen.

1) $P(Z \geq 0{,}02)$ _____

2) $P(Z \geq -1{,}42)$ _____

3) $P(Z \leq -2{,}29)$ _____

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Ein Hersteller behauptet: Höchstens 5 % seiner Bauteile sind fehlerhaft. Ein Kunde prüft 50 zufällig ausgewählte Teile. X ist die Anzahl der fehlerhaften Teile. Getestet wird die Nullhypothese H0: p <= 0,05 auf dem Signifikanzniveau 5 %. Findet der Kunde auffällig viele fehlerhafte Teile, glaubt er dem Hersteller nicht mehr (H0 wird abgelehnt). Tipp: Rechne mit p = 0,05 und suche das kleinste k, für das P(X >= k) höchstens 0,05 ist.

1) Wie viele fehlerhafte Teile erwartet man, wenn der Hersteller recht hat? (2 P.) _____

2) Berechne die Standardabweichung σ (2 Stellen). (2 P.) _____

3) Ab wie vielen fehlerhaften Teilen wird H_0 abgelehnt? (4 P.) _____

4) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art? (4 Stellen) (2 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Stochastik

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

1) $26^4 = 456.976$

2) $4! = 24$

3) $6! = 720$

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

1) $P(B) = 0{,}3 \cdot 0{,}8 + 0{,}7 \cdot 0{,}5 = 0{,}59, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}24}{0{,}59} \approx 0{,}407$

2) $P(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}8 + 0{,}6 \cdot 0{,}6 = 0{,}68, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}32}{0{,}68} \approx 0{,}471$

3) $P(B) = 0{,}5 \cdot 0{,}7 + 0{,}5 \cdot 0{,}3 = 0{,}5, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}35}{0{,}5} \approx 0{,}7$

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

1) $P(Z \geq 0{,}02) = 1 - \Phi(0{,}02) \approx 0{,}492$

2) $P(Z \geq -1{,}42) = 1 - \Phi(-1{,}42) \approx 0{,}9222$

3) $P(Z \leq -2{,}29) = \Phi(-2{,}29) \approx 0{,}011$

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $E(X) = n \cdot p = 50 \cdot 0{,}05 = 2{,}5$

2) $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{2{,}38} \approx 1{,}54$

3) $P(X \geq 5) \approx 0{,}1036 > 0{,}05, \quad P(X \geq 6) \approx 0{,}0378 \leq 0{,}05 \Rightarrow \overline{A} = \{6, \ldots, 50\}$

4) $\alpha = P(X \geq 6) \approx 0{,}0378$ (H_0 wird abgelehnt, obwohl sie stimmt)

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 41	ab 39	ab 37	ab 35	ab 33	ab 31	ab 28	ab 26	ab 24	ab 22	ab 20	ab 18	ab 15	ab 12	ab 9	ab 0