Probe-Klausur Stochastik

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

Überlege jeweils: Ist die Reihenfolge wichtig? Darf etwas mehrfach vorkommen (Zurücklegen)? Gib die Formel und das Ergebnis an.

1) Auf wie viele Arten kann man 3 Läufer auf die Bahnen verteilen?

2) Auf wie viele Arten kann man 4 Läufer auf die Bahnen verteilen?

3) Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Augenzahlen bei 4 Würfen mit einem Würfel?

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

Lege eine Vierfeldertafel oder ein Baumdiagramm an und berechne die gesuchten Wahrscheinlichkeiten. P_A(B) bedeutet: Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A.

1) $P(A) = 0{,}1,\ P_A(B) = 0{,}7,\ P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

2) $P(A) = 0{,}2,\ P_A(B) = 0{,}9,\ P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

3) $P(A) = 0{,}4,\ P_A(B) = 0{,}6,\ P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

Standardisiere mit z = (x – Erwartungswert) : Standardabweichung und lies den Wert der Verteilungsfunktion ab (Tabelle oder Taschenrechner). Runde auf 4 Nachkommastellen.

1) $P(Z \le 2{,}38)$ _____

2) $P(Z \le 1{,}36)$ _____

3) $P(Z \ge 1{,}05)$ _____

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Eine Krankheit haben 2 % der Menschen. Ein Schnelltest zeigt bei Kranken mit 95 % Wahrscheinlichkeit „positiv“. Bei Gesunden zeigt er mit 90 % Wahrscheinlichkeit richtig „negativ“. Eine zufällig ausgewählte Person wird getestet. Tipp: Zeichne ein Baumdiagramm (erst krank/gesund, dann positiv/negativ) und rechne mit Dezimalzahlen.

1) Berechne $P(\text{positiv})$ (auf 4 Stellen runden). (3 P.) _____

2) Der Test ist positiv. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Person krank? (3 Stellen) (4 P.) _____

3) Der Test ist negativ. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Person gesund? (4 Stellen) (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Stochastik

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

1) $3! = 6$

2) $4! = 24$

3) $6^4 = 1296$

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

1) $P(B) = 0{,}1 \cdot 0{,}7 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}43, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}07}{0{,}43} \approx 0{,}163$

2) $P(B) = 0{,}2 \cdot 0{,}9 + 0{,}8 \cdot 0{,}1 = 0{,}26, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}18}{0{,}26} \approx 0{,}692$

3) $P(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}6 + 0{,}6 \cdot 0{,}2 = 0{,}36, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}24}{0{,}36} \approx 0{,}667$

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

1) $P(Z \le 2{,}38) = \Phi(2{,}38) \approx 0{,}9913$

2) $P(Z \le 1{,}36) = \Phi(1{,}36) \approx 0{,}9131$

3) $P(Z \ge 1{,}05) = 1 - \Phi(1{,}05) \approx 0{,}1469$

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $0{,}02 \cdot 0{,}95 + 0{,}98 \cdot 0{,}1 \approx 0{,}117$

2) $P_{\text{pos}}(\text{krank}) = \dfrac{0{,}02 \cdot 0{,}95}{0{,}117} \approx 0{,}162$

3) $P_{\text{neg}}(\text{gesund}) = \dfrac{0{,}98 \cdot 0{,}9}{0{,}883} \approx 0{,}9989$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 41	ab 39	ab 37	ab 35	ab 33	ab 31	ab 28	ab 26	ab 24	ab 22	ab 20	ab 18	ab 15	ab 12	ab 9	ab 0