Probe-Klausur Stochastik

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

Überlege jeweils: Ist die Reihenfolge wichtig? Darf etwas mehrfach vorkommen (Zurücklegen)? Gib die Formel und das Ergebnis an.

1) Auf wie viele Arten kann man 7 Läufer auf die Bahnen verteilen?

2) Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Augenzahlen bei 3 Würfen mit einem Würfel?

3) Wie viele Möglichkeiten gibt es für eine Folge von 6 Münzwürfen (Kopf oder Zahl)?

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

Lege eine Vierfeldertafel oder ein Baumdiagramm an und berechne die gesuchten Wahrscheinlichkeiten. P_A(B) bedeutet: Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A.

1) $P(A) = 0{,}1,\ P_A(B) = 0{,}8,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}4$: $P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

2) $P(A) = 0{,}1,\ P_A(B) = 0{,}8,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}3$: $P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

3) $P(A) = 0{,}5,\ P_A(B) = 0{,}6,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}1$: $P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

Standardisiere mit z = (x – Erwartungswert) : Standardabweichung und lies den Wert der Verteilungsfunktion ab (Tabelle oder Taschenrechner). Runde auf 4 Nachkommastellen.

1) $P(Z \le -0{,}86)$ _____

2) $P(Z \le -2{,}07)$ _____

3) $P(Z \le -2{,}14)$ _____

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Ein Hersteller behauptet: Höchstens 5 % seiner Bauteile sind fehlerhaft. Ein Kunde prüft 100 zufällig ausgewählte Teile. X ist die Anzahl der fehlerhaften Teile. Getestet wird die Nullhypothese H0: p <= 0,05 auf dem Signifikanzniveau 5 %. Findet der Kunde auffällig viele fehlerhafte Teile, glaubt er dem Hersteller nicht mehr (H0 wird abgelehnt). Tipp: Rechne mit p = 0,05 und suche das kleinste k, für das P(X >= k) höchstens 0,05 ist.

1) Wie viele fehlerhafte Teile erwartet man, wenn der Hersteller recht hat? (2 P.) _____

2) Berechne die Standardabweichung σ (2 Stellen). (2 P.) _____

3) Ab wie vielen fehlerhaften Teilen wird H_0 abgelehnt? (4 P.) _____

4) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art? (4 Stellen) (2 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Stochastik

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

1) $7! = 5040$

2) $6^3 = 216$

3) $2^6 = 64$

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

1) $P(B) = 0{,}1 \cdot 0{,}8 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}44, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}08}{0{,}44} \approx 0{,}182$

2) $P(B) = 0{,}1 \cdot 0{,}8 + 0{,}9 \cdot 0{,}3 = 0{,}35, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}08}{0{,}35} \approx 0{,}229$

3) $P(B) = 0{,}5 \cdot 0{,}6 + 0{,}5 \cdot 0{,}1 = 0{,}35, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}3}{0{,}35} \approx 0{,}857$

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

1) $P(Z \le -0{,}86) = \Phi(-0{,}86) \approx 0{,}1949$

2) $P(Z \le -2{,}07) = \Phi(-2{,}07) \approx 0{,}0192$

3) $P(Z \le -2{,}14) = \Phi(-2{,}14) \approx 0{,}0162$

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $E(X) = n \cdot p = 100 \cdot 0{,}05 = 5$

2) $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{4{,}75} \approx 2{,}18$

3) $P(X \ge 9) \approx 0{,}0631 > 0{,}05, \quad P(X \ge 10) \approx 0{,}0282 \le 0{,}05 \Rightarrow \overline{A} = \{10, \ldots, 100\}$

4) $\alpha = P(X \ge 10) \approx 0{,}0282$ (H_0 wird abgelehnt, obwohl sie stimmt)

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 41	ab 39	ab 37	ab 35	ab 33	ab 31	ab 28	ab 26	ab 24	ab 22	ab 20	ab 18	ab 15	ab 12	ab 9	ab 0