Probe-Klausur Stochastik

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

Überlege jeweils: Ist die Reihenfolge wichtig? Darf etwas mehrfach vorkommen (Zurücklegen)? Gib die Formel und das Ergebnis an.

1) Wie viele Möglichkeiten gibt es für eine Folge von 3 Münzwürfen (Kopf oder Zahl)?

2) Wie viele Möglichkeiten gibt es für einen Code aus 5 Buchstaben (A bis Z)?

3) Wie viele Möglichkeiten gibt es für eine Folge von 5 Münzwürfen (Kopf oder Zahl)?

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

Lege eine Vierfeldertafel oder ein Baumdiagramm an und berechne die gesuchten Wahrscheinlichkeiten. P_A(B) bedeutet: Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A.

1) $P(A) = 0{,}1,\ P_A(B) = 0{,}9,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}7:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

2) $P(A) = 0{,}1,\ P_A(B) = 0{,}9,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}8:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

3) $P(A) = 0{,}4,\ P_A(B) = 0{,}7,\ P_{\bar{A}}(B) = 0{,}4:\quad P(B) = ?,\ P_B(A) = ?$ _____

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

Standardisiere mit z = (x – Erwartungswert) : Standardabweichung und lies den Wert der Verteilungsfunktion ab (Tabelle oder Taschenrechner). Runde auf 4 Nachkommastellen.

1) $P(Z \le -1{,}77)$ _____

2) $P(Z \le 1{,}3)$ _____

3) $P(Z \le 2{,}3)$ _____

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Ein Glücksrad bleibt mit der Wahrscheinlichkeit 0,3 auf „Gewinn“ stehen. Es wird 10-mal gedreht. Die Zufallsgröße X zählt, wie oft „Gewinn“ kommt. Weil sich die Wahrscheinlichkeit bei jedem Drehen nicht ändert, ist X binomialverteilt mit n = 10 und p = 0,3. Tipp: „mindestens einmal“ rechnest Du am leichtesten über das Gegenereignis „keinmal“.

1) Berechne $P(X = 1)$ (auf 4 Stellen runden). (3 P.) _____

2) Berechne den Erwartungswert $E(X)$. (2 P.) _____

3) Berechne $P(X \geq 1)$ (auf 4 Stellen runden). (2 P.) _____

4) Wie oft muss man mindestens drehen, damit $P(X \geq 1) \geq 0{,}9$ gilt? (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Stochastik

Aufgabe 1: Kombinatorik (je 3 P.)

1) $2^3 = 8$

2) $26^5 = 11.881.376$

3) $2^5 = 32$

Aufgabe 2: Bedingte Wahrscheinlichkeit (je 4 P.)

1) $P(B) = 0{,}1 \cdot 0{,}9 + 0{,}9 \cdot 0{,}7 = 0{,}72, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}09}{0{,}72} \approx 0{,}125$

2) $P(B) = 0{,}1 \cdot 0{,}9 + 0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}81, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}09}{0{,}81} \approx 0{,}111$

3) $P(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}7 + 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}52, \quad P_B(A) = \dfrac{0{,}28}{0{,}52} \approx 0{,}538$

Aufgabe 3: Normalverteilung (je 4 P.)

1) $P(Z \le -1{,}77) = \Phi(-1{,}77) \approx 0{,}0384$

2) $P(Z \le 1{,}3) = \Phi(1{,}3) \approx 0{,}9032$

3) $P(Z \le 2{,}3) = \Phi(2{,}3) \approx 0{,}9893$

Aufgabe 4: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $P(X = 1) = \binom{10}{1} \cdot 0{,}3^1 \cdot 0{,}7^9 \approx 0{,}1211$

2) $E(X) = n \cdot p = 10 \cdot 0{,}3 = 3$

3) $P(X \ge 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}7^{10} \approx 0{,}9718$

4) $1 - 0{,}7^m \ge 0{,}9 \;\Rightarrow\; m \ge \dfrac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}7} \approx 6{,}456 \;\Rightarrow\; m = 7$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 41	ab 39	ab 37	ab 35	ab 33	ab 31	ab 28	ab 26	ab 24	ab 22	ab 20	ab 18	ab 15	ab 12	ab 9	ab 0